

PATIENTE DE 85 ANS

- Présentant une déchirure cutanée de grade 3 (Perte complète du lambeau tissulaire) localisée sur la jambe évoluant depuis 3 jours

ANTÉCÉDENTS DU PATIENT

- Insuffisance cardiaque congestive
- Corticothérapie systémique

PROTOCOLE DE SOINS



Mepilex® Border Flex Carré OU **Mepilex® Border Flex Oval**

➡ **Renouvellement tous les 3 à 4 jours en moyenne**

EVOLUTION DE LA PLAIE



J0

- Surface initiale de 9 cm²
- Présence de signes cliniques d'infection locale
- Peau périlésionnelle saine
- Niveau d'exsudat faible (exsudat trouble et épais)



J9

- Réduction de la surface de 66% (4 cm²)
- Disparition des signes cliniques d'infection locale
- Peau périlésionnelle saine
- Absence d'exsudat



J19

- Plaie résiduelle de 1 cm²
- Peau périlésionnelle saine
- Absence d'exsudat
- Poursuite du traitement avec Mepilex® Border Flex Carré et cicatrisation complète 7 jours plus tard

ÉVALUATION DES UTILISATEURS

- Selon le soignant, Mepilex® Border Flex Carré et Oval se conforment bien à la plaie et sont faciles à appliquer.