

PATIENT DE 78 ANS

- Présentant une plaie sur la crête tibiale consécutive à une chute évoluant depuis 21 jours

ANTÉCÉDENTS DU PATIENT

- Non connus

PROTOCOLE DE SOINS

Mepilex® Border Flex Carré **OU** Mepilex® Border Flex Oval

Renouvellement tous les 2 jours en moyenne

EVOLUTION DE LA PLAIE

<p>J0</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Surface initiale de 15 cm² • Absence de signes cliniques d'infection locale • Peau périlésionnelle saine • Niveau d'exsudat faible 	<p>40% fibrine</p> <p>40% bourgeonnement</p> <p>20% épidermisation</p>
<p>J34</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peau périlésionnelle saine • Absence d'exsudat 	<p>40% bourgeonnement</p> <p>60% épidermisation</p>
<p>J52</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peau périlésionnelle saine • Absence d'exsudat • Poursuite du traitement avec Mepilex® Border Flex Oval et cicatrisation complète à J95 retardée par la survenue d'un eczéma 	<p>10% bourgeonnement</p> <p>90% épidermisation</p>

ÉVALUATION DES UTILISATEURS

- Le patient n'a pas présenté de douleur lors des renouvellements des pansements (EVA = 0 mm)
- Selon le soignant, Mepilex® Border Flex Carré et Oval se conforment très bien à la plaie et sont très faciles à appliquer.