

## PATIENTE DE 59 ANS

- Présentant un ulcère localisé sur le gros orteil gauche évoluant depuis 12 mois
- Présence du pouls pédieux et tibial postérieur (IPS=0.93)

## ANTÉCÉDENTS DU PATIENT

- Diabète de type 2
- Obésité
- Hypertension
- Cataracte
- Ulcère du pied droit

## PROTOCOLE DE SOINS



## EVOLUTION DE LA PLAIE

J1



- Plaie bourgeonnante mesurant 2,25 cm<sup>2</sup>
- Présence d'hyperkératose et de macération sur la peau périlésionnelle
- Absence de signes cliniques d'infection locale
- Niveau d'exsudat modéré

J14



- Plaie résiduelle mesurant 0,16 cm<sup>2</sup> (réduction de la surface de 92,9%)
- Amélioration de l'état de la peau périlésionnelle (diminution de la macération)
- Niveau d'exsudat faible

J21



- Cicatrisation complète
- Peau périlésionnelle saine et intacte

## ÉVALUATION DES UTILISATEURS

- Le patient n'a pas présenté de douleur lors des renouvellements des pansements (EVA = 0 mm)
- Selon le soignant, Mepilex® Border Flex Carré se conforme bien à la plaie, est facile à appliquer et a une bonne capacité à rester en place après la pose.