

## PATIENT DE 78 ANS

- Présentant une plaie traumatique sur le cuir chevelu initialement suturée évoluant depuis 15 jours

## ANTÉCÉDENTS DU PATIENT

- Non connus

## PROTOCOLE DE SOINS



Mepilex® Border Flex Oval



Renouvellement  
tous les 2 jours  
en moyenne

## EVOLUTION DE LA PLAIE



J0

- Surface initiale de la plaie 9.9 cm<sup>2</sup>
- Présence de nécrose humide (avant détersion)
- Absence de signes cliniques d'infection locale
- Présence d'un érythème périlésionnel
- Absence d'exsudat



J6

- Réduction de la surface de 20% (8 cm<sup>2</sup>)
- Présence de nécrose (avant détersion)
- Disparition de l'érythème périlésionnel
- Absence d'exsudat



J24

- Réduction de la surface de 86% (2.4 cm<sup>2</sup>)
- Plaie 100% bourgeonnante
- Peau périlésionnelle saine
- Absence d'exsudat
- Poursuite du traitement avec Mepilex® Border Flex Oval et cicatrisation complète à J82 retardée par des lésions de grattage

## ÉVALUATION DES UTILISATEURS

- Le patient n'a pas présenté de douleur lors des renouvellements des pansements (EVA = 0 mm)
- Selon le soignant, Mepilex® Border Flex Oval se conforme très bien à la plaie et est très facile à appliquer.